


Retard de chute du cordon ombilical

Définition du retard de chute du cordon:

Absence de chute du cordon à **4 semaines de vie**

La durée de vie habituelle du cordon ombilical est d'environ 15 jours. Une antiseptie du cordon à la Chlorhexidine alcoolique 2% est préconisée aux HUG (Octenisept si <32 semaines) pendant les 15 premiers jours de vie. A réévaluer en présence de signes d'inflammation ou infectieux.

Attitude résumée:



Anamnèse :

- Leucocytose et infections cutanées récurrentes = suspicion d'anomalie de l'adhésion leucocytaire

Examens :

- US abdominal (exclure pathologie abdominale/base cordon, en particulier ouraque et Meckel)
- En cas d'infections, même une FSC normale ne permet pas d'exclure une LAD

Traitement : (si absence de signes cliniques d'infection et d'autres signes d'alarme)

- Arrêt de la désinfection si encore en cours
- Traiter avec talc en poudre pendant 1-2 semaines - dessèche mais sans désinfection
- Couper et nitrate d'argent si pas de pathologie ni chute à 6 semaines

Talc PhEur® pdre 80g (code : 407290) : en stock en Neonat. Stable 2 mois après ouverture à temp. ambiante (protéger de l'humidité, ne pas utiliser dans l'incubateur, refermer après usage).